

GEM (1000)

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
ゲムシタビン	点滴静注	1000mg/ m ²	Day1.8.15	28	

S-1+GEM 【S-1:2投1休】

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
ゲムシタビン	点滴静注	1000mg/ m ²	Day1.8	21	
テガフル・ギメラシル・ オテラシルカリウム	内服	40mg/m ² / 回 1日2回	Day1夕-15朝	21	

S-1+GEM 【S-1:2投2休】

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
ゲムシタビン	点滴静注	1000mg/ m ²	Day1.8.15	28	
テガフル・ギメラシル・ オテラシルカリウム	内服	40mg/m ² / 回 1日2回	Day1夕-15朝	21	

FOLFIRINOX

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
レボホリナート	点滴静注	200mg/m ²	Day1	14	
オキサリプラチン	点滴静注	85mg/m ²	Day1	14	
イリノテカン	点滴静注	180mg/m ²	Day1	14	
フルオロウラシル	点滴静注	400mg/m ²	Day1	14	
フルオロウラシル	点滴静注	2400mg/ m ²	Day1 (46時間 かけて投与)	14	インフューザー [®] - ポンプ [®] 使用

GC (GEM+CDDP)

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
ゲムシタビン	点滴静注	1000mg/ m ²	Day1.8	21	
シスプラチン	点滴静注	25mg/m ²	Day1.8	21	

nab-PTX+GEM (3投1休)

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
パクリタキセル アルブミン懸濁 型注射用	点滴静注	125mg/m ²	Day1.8.15	28	
ゲムシタビン	点滴静注	1000mg/ m ²	Day1.8.15	28	

Ramucirumab(8)

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
ラムシルマブ	点滴静注	8mg/kg	Day1	14	

オニハ[®] 卜[®] +5FU/I-LV

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
イリノテカン リポソーム製剤	点滴静注	70mg/m ²	Day1	14	
レボホリナート	点滴静注	200mg/m ²	Day1	14	
フルオロウラシル	点滴静注	2400mg/ m ²	Day1 (46時間 かけて投与)	14	インフューザ [®] -ホ ンブ [®] 使用

Atezolizumab+BV(1200/15)

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
アテゾリズマブ	点滴静注	1200mg /bpd	Day1	21	
ベバシズマブ	点滴静注	15mg/kg	Day1	21	

Streptozocin(1000)(Weekly)

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
ストレプトゾシン	点滴静注	1000mg/ m ²	Day1	7	

Streptozocin(500)(5日間投与)

使用薬剤名 (一般名)	用法	用量	投与日	1コース (日)	詳細説明
ストレプトゾシン	点滴静注	500mg/m ²	Day1-5	42	